

Эраконд. Заболевания пищеварительной системы. При пищевых токсикоинфекциях прием внутрь по 5-10мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 2 раза в день. При эзофагитах, язвах желудка и 12-перстной кишки, гипер- и гипосекреторных гастритах, энтеритах и колитах прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 2 раза в день в течение 1-2 месяцев. При гепатитах и циррозах любой этиологии, жировой дистрофии печени, дискинезиях желчевыводящих путей, панкреатитах прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 3 раза в день в течение 1-2 месяцев.

Заболевания дыхательной системы. При острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 3 раз в день в течение 5-15 дней. При ангинах стенки зева обрабатывать 40% раствором 4 раза в день, полость рта и глотки полоскать 10% раствором 5-6 раз в день после еды. При ларингитах применяют орошение задней стенки глотки 2 -5 мл 10% раствора (с помощью горланного шприца) 2 раза в день после еды в течение 10 дней. При острых и хронических (в т.ч. атрофических) риносинуситах закапывать 10% раствор в полость носа 5-6 раз в день (и/или вводить в полость носа тампоны, смоченные 10% раствором на 15-20 мин), одновременно прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 2 раза в день в течение 1-2 месяцев. При хронических заболеваниях дыхательных путей, бронхиальной астме, прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 3 раза в день, курс 10 дней с 5-дневным интервалом в течение 1-2 месяцев. Ингаляции 1.5% раствором 2 раза в день с использованием ультразвукового ингалятора.

Заболевания кожи и аллергические реакции. При хронических заболеваниях кожи (нейродермит, экзема, псориаз,), аллергических реакциях (ринит, слезотечение, зуд, отек, гиперемия кожных покровов и слизистых оболочек) прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 3 раза в день, курс 10 дней с 5-дневными интервалами в течение 1 месяца. Пораженные участки кожи обрабатывать 10% раствором несколько раз в день в виде примочек на 10-15 мин и/или смазывать 10% мазью. При псориазе рекомендуется обрабатывать пораженные участки 40% раствором 2 раза в день (аппликации на 20-30 мин), затем промыть их теплой водой.

Травмы. При переломах костей для ускорения сращения по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 3 раза в день, курс 10 дней с 5-дневными интервалами до полного сращения.

Лучевые поражения, ожоговые раны, трофические язвы, пролежни. При лучевых и трофических язвах, ожогах, гнойно-воспалительных заболеваниях костной системы и мягких тканей (остеомиелит, абсцессы, флегмоны, целлюлит, пиодермии, трихофитии) прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 3 раза в день, курс 10 дней с 5-

дневными интервалами. Местно применять 10% водный раствор на всех стадиях ожоговой болезни в виде примочек и повязок, использовать 10% мазь в пролиферативной фазе до полного заживления.

Заболевания сердечно-сосудистой системы и жидкий экстракт люцерны. В целях профилактики атеросклероза, повышения эластичности сосудов, снижения уровня холестерина в крови применять по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 3 раза в день курсами по 20 дней с 10-дневными интервалами. После перенесенных инфарктов (в составе комплексной восстанавливающей терапии) по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 3-4 раза в день, курс 30 дней с 5-дневными интервалами.

Для профилактики онкологических заболеваний, выведения радионуклидов, канцерогенов, токсинов и солей тяжелых металлов прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 2-3 раза в день, в течение 30-60 дней с 30 дневными интервалами. Для уменьшения интоксикационного синдрома и защите печени при химио-лучевой терапии прием внутрь по 10 мл (2 ч. ложки) 40% раствора 2 раза в день.

Эндокринные заболевания. При сахарном диабете оказывает умеренное гипогликемическое действие. Прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 2-3 раза в день.

Урология и гинекология и эраконд. При заболеваниях почек и мочевыводящих путей (пиелонефриты, циститы, уретриты) по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 2 раза в день. При гинекологических заболеваниях (эрозия шейки матки, кольпиты, бактериальный вагиноз, кандидоз влагалища) прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 1-3 раза в день, местно спринцевание (на ночь вводить во влагалище смоченный тампон) теплым 10% раствором. При появлении жжения концентрацию раствора уменьшают в 2 раза.

При геморрое применять 10% раствор в виде теплых ванночек на 10-15 мин и микроклизм (5-7 мл).

При инфекционных заболеваниях. При туберкулезе (в составе комплексной терапии) по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 2 раза в день.

Стоматология. При стоматите, гингивите, пародонтите местно в виде тампонов, смоченных теплым 10% раствором. При обширном поражении полость рта полоскать 10% раствором и прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 40% раствора 2 раза в день в течение 2-3 недель. При профилактике кариеса прием внутрь по 5-10 мл (1-2 ч. ложки) 10% раствора 1 раза в день в течение 5-6 месяцев.